

NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Vad innebär det?

Beteendediagnoser – de ställs utifrån personens beteende inte medicinsk orsak men biologisk bakgrund

Annorlunda kognition – man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt.

Adhd, autism, Tourettes, språkstörning, dyslexi.

Vanligt att ha flera npf samtidigt och samsjuklighet.

Adhd och add (ca 5 procent)

En person som har adhd har främst svårigheter inom exekutiva funktioner, alltså områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna ta initiativ eller hejda impulser. Add är som adhd men utan överaktiviteten. Personen blir lätt distraherad och tappar uppmärksamheten, men är inte överaktiv.

Autism (1-2 procent)


Funktionsområden är annorlunda eller nedsatta, till exempel:

- förmågan till socialt samspel och social kommunikation
- detaljer men inte helhet/sammanhang (central koherens)
- föreställningsförmågan - att föreställa sig det man inte ser, inlevelse i andra
- medvetenhet om sitt eget och andras tänkande
- samordna sin uppmärksamhet med någon annan.

Individen kan också ha ett annorlunda sätt att tolka sinnesintryck. Vissa personer kan till exempel ha en överkänslighet för ljud, ljus, beröring eller lukt, medan andra kan ha en nedsatt känslighet inom dessa perceptionsområden.

Ålder för autismsdiagnos

- Vanligast att få diagnos vid 5-11 års ålder, män/pojkar får diagnos tidigare än flickor/kvinnor




Fråga: Vid vilken ålder fick du din autismsdiagnos? /

Vid vilken ålder fick den person du stöttar sin autismsdiagnos?

Bas: Samtliga, 2 633 intervjuer

Flickor i äldre åldersgrupper har längst frånvaro

Ungefär hur stor frånvaro har barnet haft under det senaste året av andra skäl än sjukdom eller annan beviljad ledighet?



Bas: Samtliga, 1 743 intervjuer